

# Dobbelt antal med halv dosis - anbragt rigtigt !

I flere numre af SDE-nyt samt på [www.sde-biavl.dk](http://www.sde-biavl.dk) kan man læse artikler, der fortæller noget om var-roamidernes resistens mod Bayticol.

Jeg mener ikke, det er tilfældet, og jeg har lavet en prøve med det. Jeg har sat en pind ned til bierne i et døgn, lagt et indskud under og anbragt resultatet mellem to stykker plast (lamineret)

Jeg har ikke talt dem, men der er mange mider, og det er endda Bayticol, som er 2 år gammel. Da Bayticol kom frem i 50'erne, var indholdet af flumethrin dobbelt så stort som i dag, men det virker stadig, måske ikke så voldsomt, men det er stadig et kontaktmiddel på en pind, som skal være fuldstændig tør, inden den sættes til Bierne. Det anbefales så i år at sætte 2 pinde ned



ved siderne af yngellejet, forskudt for hinanden, og opholdet i stedet anbefales kun at være i 18 Døgn, så skal pinden fjernes igen, for så er det forseglede Yngel løbet ud. Der er et lille men ved Pinden: De nykrøbne Bier er skrøbelige og kan påvirkes af at røre ved pinden. Det kan de ikke holde til. Sæt derfor pinden ude i siderne og ikke i midten af yngellejet.

PP