

# Myresyre og lyngtræk

Af Chr. Juul, Læsø



Jeg har gennem flere år hjulpet mange biavlere fra begge biavlerforeninger på Læsø med at fremstille pinde til varroabekæmpelsen. Her i år var der så én, der ikke henvendte sig, og det undrede mig. Jeg mente da, han stadig havde bier.

Da jeg spurgte ham, fortalte han, at han var blevet rådet til at bruge myresyre, så han havde ikke brug for pinde. Han fortalte også, at han nok slet ikke havde mider, for der var næsten ingen faldet ned ved myresyrebehandlingen. Det undrede mig, så jeg foreslog ham et eksperiment. Jeg ville sætte pinde ned i hans bifamilier,

og hvis der stadig ikke faldt mider ned, måtte han jo have ret, Så var der nok ingen mider.

Som sagt så gjort. I uge 44 kom der pinde i alle hans stader, og en uge efter var hans varroabakker fulde af mider. Det blev han noget forbavset over.

Måske har det noget at gøre med temperaturen ved myresyrebehandlingen. Læsø er jo et lyngområde, hvor vi først kan behandle efter lyngtrækket, og det er sjældent før sidst i september, først i oktober, vi er færdige med honninghøsten, og så kan temperaturen godt blive for lav.

●